

## Falso Aneurisma Pós-Traumático da Artéria Subclávia

*Post-Traumatic Pseudo-Aneurysm of the Subclavian Artery*

Joana Moreira, Luís Antunes, Ana Baptista,  
Óscar Gonçalves, Albuquerque Matos


SERVIÇO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR  
HOSPITAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Doente do sexo feminino de 82 anos que recorreu ao Serviço de Urgência por queixas de dor e tumefacção na região supraclavicular direita com cerca de duas semanas de evolução. Antecedentes de Diabetes *mellitus*, HTA e Dislipidemia.

História de fractura da clavícula direita há um ano e meio, submetida a tratamento conservador | FIGURA 1 |.

Ao exame objectivo com massa pulsátil da região supraclavicular direita, com cerca de 5 cm de diâmetro | FIGURA 2 |. Analiticamente sem alterações relevantes.

Realizou Ecodöppler que mostrou falso aneurisma da artéria subclávia direita, parcialmente trombosado. A Angio-TAC confirmou a presença do falso aneurisma, com 5 cm de diâmetro transverso, com um colo de cerca de 7 mm | FIGURAS 3 E 4 |.



| FIGURA 1 |



| FIGURA 2 |


A doente foi submetida a tratamento cirúrgico convencional, abordagem supraclavicular, exérese do terço médio da clavícula, isolamento da artéria subclávia proximal e distal ao falso aneurisma, abertura do falso aneurisma, rafia primária da artéria subclávia, exérese do falso aneurisma e encerramento por planos | FIGURAS 5 E 6 |. A intervenção e o pós-operatório decorreram sem intercorrências. Observada em consulta um mês após a intervenção encontrava-se bem, com pulso radial direito palpável.




| FIGURA 3 |



| FIGURA 5 |



| FIGURA 4 |



| FIGURA 6 |