

de SAMPAIO (cf. Man. Fl. Portug.: 351, 1912) – Trancoso, de Caminha a Mira; COUTINHO, cf. Fl. Portugal, ed. 2: 530, 1939) – Minho, Beira transmontana e litoral; e FRANCO (cf. Nova Fl. Portugal 1: 527, 1971) – regiões NW ocidental e CW arenoso. Por consulta de exemplares arquivados nos herbários COI, LISE, LISI e LISU apresentam-se as citações provinciais:

**ALTO ALENTEJO:** Vendas Novas, vale do Arneiro, 29SNC48, 11-IV-1946, *Garcia & Sousa* 1057, COI. **BAIXO ALENTEJO:** Alcácer do Sal, açudes de Palma, 29SNC35, 30-IV-1951, LISU 140227. **BEIRA ALTA:** Guarda, Serra da Estrela, vale do Mondego, 29TPE48, 22-VI-1928, *Carriso & Mendonça*, COI; Trancoso, Fiães, 29TPF31, 13-VII-1908, LISU P 27506. **BEIRA LITORAL:** Águeda, Fermentelos, Porto da Minhoteira, 29TNE49, 5-V-1977, *A. Marques & A. Pereira* 137, COI; Águeda, lagoa de Pateira de Fermentelos, 29TNE49, 24-IV-1978, *A. Marques* 662, COI; Aveiro, Eixo, 29TNE39, 13-IV-1953, LISU P 27506; Idem, ponte de Azurva, 29TNE39, 20-IV-1965, *A. Fernandes, R. Fernandes & J. Paiva* 9266, COI; Idem, 22-V-1954, *J. Matos, A. Matos & A. Marques* 4908, COI; Aveiro, entre Oliveira do Bairro e Aveiro, 29TNE48, V-1880, *M. Ferreira*, COI; Aveiro, Requeixo, pr. Cabedelo, 29TNE39, 29-V-1978, *A. Marques* 732, COI; Aveiro, Requeixo, pr. Olhos da Azenha, rib. do Pano, 29TNE39, 24-V-1977, *A. Marques & A. Pereira* 188, COI; Aveiro, Requeixo, região de Barreiras, 29TNE39, 15-V-1978, *A. Marques* 717, COI; Figueira da Foz, paul da Foja, 29TNE24, VI, 1880, *M. Ferreira*, COI; Figueira da Foz, pinhal do Urso, 29TNE14, 26-IV-1929, *Carriso & Mendonça* 1522, COI. **DOURO LITORAL:** Vila do Conde, 29TNF27, VI-1889, *J. Casimiro Barbosa*, COI; Idem, LISE 14993; Idem, LISI 2886/1940; Idem, LISU P 27503 & P 27504; Vila do Conde, Azurara, 29TNF27, 2-VI-1960, LISE 88551; Vila Nova de Gaia, Senhor da Pedra, 29TNF24, VI-1901, *G. Sampaio*, COI.

***Apium inundatum* (L.) Rchb. fil., sua corologia em Portugal em adição à *Flora iberica* X**

Na Primavera de 2007 colectou-se um espécime de *Apium* L. parcialmente submerso nas águas paradas e pouco profundas do rio Fresno no NE de Portugal que se determinou como *Apium inundatum* (L.) Rchb. fil..

**TRÁS-OS-MONTES:** Miranda do Douro, Póvoa, rio Fresno, 29TQG2606, 7-VI-2007, *V. Silva & O. Póvoa*, LISI 202/2008.

Este táxone é citado nas floras básicas

S.G. KNEES [in CASTROVIEJO *et al.* (eds.), Fl. Iber. 10: 269-275, 2003] não refere

esta planta para Portugal. Posteriormente J. DOMINGUES DE ALMEIDA [cf. Bot. Complut. 30: 150, 2006] em adição à *Flora iberica X: Umbelliferae* cita-a apenas para a província portuguesa BL. Até ao momento, e de acordo com as fontes consultadas, o conhecimento da distribuição deste táxone em território nacional é o seguinte: AAI BA BAI BL DL [Mi] TM.

O exemplar de *A. inundatum* encontrado no curso de água que corre na paisagem granítica local aparece como espécie companheira numa comunidade de *Mentha cervina* L.: *Cypero badii-Menthetum cervinae* Rivas Goday in Rivas Goday *et al.* 1956 *nom. mut.*, associação frequente no Sector Salmantino como refere COSTA *et al.* [in Quercetea 0: 23, 1998].

### Agradecimentos

Aos responsáveis dos herbários COL, LISE, LISI e LISU.

**Vasco Silva**, *vascosilva@isa.utl.pt*, Instituto Superior de Agronomia; **Orlanda Póvoa**, *opovoa@esaelvas.pt*, Escola Superior Agrária de Elvas & **Teresa Vasconcelos**, *tvasconcelos@isa.utl.pt*, Instituto Superior de Agronomia.