

***Helianthemum apenninum* (L.) Mill. subsp. *apenninum* (Cistaceae), um caméfito novo para a flora de Portugal**

O *Helianthemum apenninum* subsp. *apenninum* é um caméfito sufruticoso acinzentado, de distribuição mediterrânica-europeia. Na Primavera de 2005 detectamos este taxon nos planaltos de Miranda e da Beira Alta, onde, consoante pudemos averiguar entre 2006 e 2009, ocorre com alguma frequência. Curiosamente, não encontramos na bibliografia florística referente a Trás-os-Montes qualquer alusão a este pequeno arbusto, provavelmente porque passa facilmente despercebido por entre as plantas do abundantíssimo *Halimium umbellatum* subsp. *viscosum*. A ecologia *H. apenninum* subsp. *apenninum* nos planaltos de Miranda e da Beira Transmontana parece ser constante. Surge em formações de Celtica (*Stipa*) gigantea ou em matos pioneiros, fitocenoticamente insaturados, de *Halimium umbellatum* subsp. *viscosum* e *Lavandula pedunculata* s.l., sempre em solos com alguma humidade, geralmente na vizinhança de algum lameiro de

secadal (lameiros com vegetação de *Stipo-Agrostietea castellanae*). Além desta subespécie, em Portugal, concretamente nos arredores de Bragança, surge o *H. apenninum* subsp. *rothmaleri* (Rothm.) Mayor & Fdez. Benito, um endemismo luso-orensano-leonês, que se distingue facilmente da subespécie tipo pela sua corola amarela.

MIRANDA DO DOURO: Miranda do Douro, Buraca, na vizinhança de lameiros dispersos em azinhal arbustivo, ca. 600m alt., 29TQF2896, 6-V-2005, A. Amado & C. Aguiar 520, Herb. Esc. Sup. Agrária de Bragança 6567

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO: Escarigo, encostas sobranceiras ao rio seco, ca. 540 m, 19-V-2005, 29TPF 827233, A. Amado & C. Aguiar 519, Herb. Esc. Sup. Agrária de Bragança 6568

Carlos Aguiar, Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Escola Superior Agrária de Bragança, cfaguiar@ipb.pt; **Anabela Amado**, Eng^a Biofísica, colaboradora do Herb. Esc. Sup. Agrária de Bragança